


## Ratonero calzado (*Buteo lagopus*)




**Características:** el distintivo más seguro en el campo es la cola, que no presenta bandas o franjas. El obispillo es claro y en la cola la faja final oscura. La cabeza es

ostensiblemente más clara que el plumaje corporal, pero la coloración es variable, al igual que en el caso afín del ratonero común. En aves que se advierte que las patas presentan plumas hasta el punto de arranque de los dedos de los pies. Con frecuencia se ciernen, aleteando simplemente en el aire, pero sin moverse hacia adelante.

**Habitat:** la tundra al norte de la zona de bosques espesos. A partir de agosto, estas aves emigran hacia el sur, apareciendo en noviembre en las regiones más templadas de Centroeuropa, donde invernan. En primavera siguen a la nieve en retirada.

**Reproducción:** en mayo estas aves exhiben sus vuelos de celo sobre el territorio de



Env. 140 cm

cria, siendo muy propensas en este tiempo a proferir gritos. A finales de mayo mejoran y remozan un nido antiguo. Los nidos están situados normalmente sobre franjas rocosas, algunas veces incluso sobre el suelo llano o sobre árboles; son construcciones de palo, sólidas, con un suelo de hierba espesa y calido. Los pequeños salen del huevo a finales de junio o principios de julio, después de una incubación aproximada de 30 días. El número de huevos depende de la cantidad de lemmings, que es el principal alimento de los ratoneros calzados: en años de abundancia de estas aves ponen hasta siete huevos, pero en años de escasez no se sienten predispuestas a criar. Los primeros 14 días los pequeños son alimentados solo por la madre, después los padres sueltan la presa simplemente en el borde del nido.

**Dieta:** sobre todo, lemmings, que son capturados al vuelo o desde un oteadero.

## Aguila calzada (*Hieraetus pennatus*)



**Características:** envergadura alar de unos 120 centímetros, del tamaño de un ratonero. Una parte de coloración pardo oscura monocolor y otra de coloración terrosa clara.

**Dieta:** sus pies poderosos y amplios, dotados de fuertes garras, acreditan al águila calzada como auténtica águila. Caza en el suelo y en el aire, captura desde lagartos hasta conejos, además de aves menores, hasta el tamaño de la codorniz. A otras rapaces las expulsa de su territorio en luchas aéreas llevadas con virtuosismo, siendo su territorio tan grande que no resulta fácil ver al águila que lo controla. En septiembre u octubre, estas aves abandonan su territorio de cría, trasladándose a las sabanas de África.


**Vientre:** casi blanco, puntas de las alas negras. Manchas claras en el dorso.

**Habitat:** camufladas con bosques, campos y monte bajo. El vuelo del águila calzada es algo oscilante, recordando al vuelo de los milanos. Se pasa casi todo el día volando, nada más que se levanta el viento, planeando a bastante altura.

**Reproducción:** en mayo, durante la época de celo, deja oír su fina y aguda voz sobre el territorio de cría (fuera de esta época estas aves no suelen gritar). Aparte, el macho demuestra su agilidad en vuelos acrobáticos. Las águilas calzadas incuban en los árboles, ponen dos huevos a finales de abril o a principios de mayo, los incuban unos 30 días, pudiendo el macho sustituir a la hembra en esta misión durante breves

intervalos. A pesar de poner sólo dos huevos, raramente llegan los dos pequeños a la mayoría de edad. Con unos 35 días el pequeño empieza con sus intentos de vuelo, su plumaje es completo a los 45 días; vuela ya a los 55, generalmente a finales de agosto.

Env. 120 cm



Cavilanes